



流感疫苗

每年政府會透過「政府防疫注射計劃」免費為指定人士接種流感疫苗。同時，亦會透過「疫苗資助計劃」為合資格的兒童和長者提供疫苗注射的資助。2011/2012年度的「疫苗資助計劃」已經於9月26日展開。合資格人士可在參與計劃的私家診所接種受資助的流感疫苗。因此大家應增加有關的認識，在流感季節來臨前作好準備。

健康焦點

政府防疫注射計劃

以下人士可於2011年11月1日起，

到衛生署或醫管局轄下的指定診所免費接受流感疫苗注射。

1. 居於安老院舍的長者或殘疾人士院舍的院友
2. 50歲或以上領取綜援人士
3. 65歲或以上有長期健康問題而在公營門診求診的長者
4. 65歲以下領取綜援有長期健康問題的人士，及部分有長期健康問題的醫管局住院病人
5. 年齡介於6個月至未滿6歲來自綜援家庭的兒童
6. 領取綜援的孕婦
7. 醫護人員
8. 家禽業從業員或須從事屠宰家禽行動的人員
9. 從事養豬或屠宰豬隻行業的人士

免費

兒童流感疫苗資助計劃



政府提供每劑流感疫苗港幣\$80的資助，家長可帶子女到已登記參與計劃的私家診所接種疫苗。

合資格兒童必須是：

- 香港居民；及
- 年齡介乎6個月至未滿6歲；或
- 就讀於香港的幼稚園或幼兒中心

長者疫苗資助計劃



政府提供每劑流感疫苗港幣\$130及每劑肺炎球菌疫苗港幣\$190的資助，給予合資格的長者到參與計劃的私家診所接種疫苗。

去年已接種過肺炎球菌疫苗的長者，今年毋須再次接種。

合資格長者必須是：

- 香港居民；及
- 在今年內年齡為65歲或以上

更多資訊

★ 想知更多預防疫苗的資訊？請瀏覽「香港紅十字會健康之友通訊」：

http://www.redcross.org.hk/hcs_files/hf_news/200909.pdf

★ 市民亦應做足防感染的措施。有關傳染病的資訊，請瀏覽「香港紅十字會健康之友通訊」：預防流感：

http://www.redcross.org.hk/hcs_files/hf_news/200903.pdf

肺炎球菌感染：

http://www.redcross.org.hk/hcs_files/hf_news/200906.pdf

★ 參考資料 / 有用資訊：衛生防護中心

流行性感冒：

<http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/22663.html>

肺炎球菌感染：

<http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/10584.html>

伙伴協作

您還可以聯絡我們，協作更多健康推廣活動...

- 健康專題講座: 1)預防疫苗與你 2)預防流感 3)其他常見傳染病
- 健康教育展板借用：預防傳染病 (共12條)
- 其他活動合作，請聯絡項目主任葉小姐: 3103 4019



kannas.yip@redcross.org.hk





流感疫苗的種類

	滅活流感疫苗	減活流感疫苗
疫苗特性	<ul style="list-style-type: none"> 含已死亡的病毒 透過注射接種 	<ul style="list-style-type: none"> 含已弱化的病毒 透過噴鼻接種
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 曾對滅活疫苗或其中的成份(如新霉素、多粘菌素)有過敏反應之人士，都不宜接種滅活流感疫苗 確診或懷疑對雞蛋敏感的人士如欲接種流感疫苗，應先由醫生進行評估再按個別情況接種 如接種當日因病發燒，應延遲至病癒後才接種疫苗 	<p>以下人士均不宜接種滅活流感疫苗：</p> <ul style="list-style-type: none"> 孕婦 對滅活流感疫苗其中的成份或雞蛋有過敏的人士 有長期健康問題或免疫系統減弱的成人和兒童 曾證實患上哮喘或喘鳴的2至4歲兒童，或醫療記錄顯示過去12個月內曾發生過喘鳴的人士 長期服用亞士匹林或水楊酸的6個月至18歲的兒童和青年 鼻塞可能會妨礙疫苗到達鼻腔，因此應延遲到鼻塞情況改善後才接種疫苗 如接種當日因病發燒，應延遲至病癒後才接種疫苗
建議接種對象	<ul style="list-style-type: none"> 適用於6個月或以上的人士，包括有長期健康問題和健康人士 	<ul style="list-style-type: none"> 只適用於健康和沒有懷孕的2至49歲人士
	<ul style="list-style-type: none"> 健康和沒有懷孕的2至49歲人士。如果沒有敏感，兩種疫苗均可以選擇 	

參考資料

- 衛生防護中心 http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/17980.html



流感疫苗接種的注意事項

滅活流感疫苗

- 滅活流感疫苗的注射處可能出現輕微腫痛，一般並無其他副作用
- 部份人士會在接種後6至12小時內出現發燒、肌肉或關節疼痛，及疲倦等徵狀，而這些徵狀通常會在兩天內減退
- 若持續發燒或不適，請諮詢醫生意見
- 嚴重的過敏反應如出現皮疹、口舌腫脹或呼吸困難等，應立即求醫

減活流感疫苗

- 接種減活流感疫苗後，於所有年齡人士最常見的副作用包括流鼻水或鼻塞
- 兒童接種後的副作用包括 37.8 °C 或以上的發燒、頭痛和肌肉疼痛
- 成人接種後的副作用包括喉嚨痛、頭痛、疲倦或虛弱、肌肉疼痛和咳嗽
- 減活流感疫苗引起的嚴重事故較為罕見

參考資料

- 衛生防護中心 http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/17980.html

****以上內容只作參考用途****