



香港紅十字會  
HONG KONG RED CROSS

# 吸入催淚劑的處理



眼睛痛楚流淚，口鼻灼熱感覺及流鼻水，產生不安感及感覺呼吸困難

以使目標人物失去行為能力

徵狀通常在短時間消退

刺激人體皮膚及外露的黏膜，引致皮膚紅腫灼痛

嚴重時可引致嚴重過敏反應及哮喘發作



## + 處理方法

1. 在處理傷病者前應穿戴保護性衣服、口罩及手套
2. 將受污染者移到通風的地方
3. 除去受污染的衣物，並用大量清水清洗患處
4. 檢查傷病者有否其他損傷及過敏反應
5. 如患處出現燒傷情況，應作燒傷處理



## ! 注意事項

- 不可使用暖水及熱水
- 避免擦洗患處

# 如引致呼吸困難...

## ✦ 處理方法

1. 確保氣道暢通
  2. 安置傷病者於呼吸最舒適的位置，通常為坐起
  3. 鬆解頸、胸、腰緊身衣物
  4. 保暖
  5. 安慰及陪伴傷病者
  6. 密切注意呼吸、脈搏及清醒程度之改變
  7. 速送醫院
- \* 若哮喘傷病者身上攜有噴霧藥劑，可協助傷病者自行使用



## 室內有催淚氣體，可以怎樣？



參考資料：

- 香港賽馬會災難防護應變教研中心
- 香港紅十字會急救訓練組及防災備災訓練組

圖片來源：

- 由 Studio Incendo - 20140928 #umbrellamovement #umbrellarevolution, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48232826>

以上資料只供參考  
更新日期: 2019年9月27日