



香港紅十字會
HONG KONG RED CROSS

工作場所接獲確診 病例通知的處理



疫情持續，要有效減低2019冠狀病毒病在社區傳播，我們必須共同堵截源頭，切斷傳播鏈，以防止病毒進一步散播。若不幸有員工確診感染新冠病毒，應如何處理呢？機構可參照以下處理流程圖，作出合適的應對措施。

如接獲初步對2019冠狀病毒病檢測呈陽性或已確診病例的通知，而該同事在潛伏期或感染期曾在工作場所工作：

應盡快關閉工作場所，並建議其他員工留在家裡而不要回辦公室

協助衛生防護中心，提供過去兩星期的員工名單，包括姓名，香港身份證號碼和電話號碼。

一般情況下，確診病例的密切接觸者都會被安排檢疫。一般來說，那些在沒有佩戴外科口罩的情況下曾與確診者接觸的人士會被視為密切接觸者(例如，曾與確診病例一起進餐、沒有配戴口罩下的面對面接觸等)。衛生防護中心會按個別情況評估有關員工是否屬於密切接觸者。衛生防護中心會個別聯絡他們，通知他們有關安排。員工應留在家中並等待衛生防護中心的電話。同時，應嚴格遵守個人衛生。


盡快安排徹底的環境消毒！

通常，辦公室應保持關閉，直到衛生防護中心有進一步建議。





緊密接觸者在等待衛生防護中心電話聯絡時，
應採取以下感染控制建議：



1. 應留在家中並等待衛生防護中心的聯絡電話作進一步安排
2. 盡量留在單人房間內
3. 打開窗戶，保持室內空氣流通
4. 員工及同住家人亦應盡可能佩戴口罩
5. 避免與家人共同進餐和共享私人物品
6. 經常保持個人衛生
7. 經常清潔和消毒家居環境及共用物品，如門柄及電視遙控器等
8. 如廁後先蓋上廁板才沖廁
9. 每日量體溫
10. 如出現病徵有任何加劇情況，應立即通知衛生署



加強工作場所環境消毒



1. 用**1比49**稀釋家用漂白水(即把1份5.25%漂白水與49份清水混和)消毒所有可能被污染的環境表面及用品
2. 當有**溢出血液、分泌物、嘔吐物或排泄物**等污染時，應加強措施：
 - (a)負責清潔的員工應穿上適當的個人防護裝備
 - (b)使用鉗子夾住吸水力強的即棄抹布抹去血液、分泌物、嘔吐物或排泄物
 - (c)然後小心棄置用後鉗子及即棄抹布於廢物袋內
 - (d)使用**1比4**稀釋家用漂白水消毒，待10分鐘後，再用清水清洗，然後抹乾
 - (e)完成後，將所有廢物和清潔用具棄置於廢物袋內
 - (f)小心除下個人防護裝備並將之棄置於廢物袋，隨即潔手
 - (g)佩戴新手套，妥善包紮廢物袋及正確棄置於有蓋垃圾桶內，將垃圾桶貼上標記和放在不受打擾的安全地方直到收取
 - (h)**小心除下手套，以梘液和清水清洗雙手**
 - (i)一旦確認為2019冠狀病毒病時，衛生防護中心會通知食環署消毒受污染的環境並棄置廢物