



香港紅十字會
HONG KONG RED CROSS

日本腦炎




【明報專訊】衛生防護中心昨公布一宗日本腦炎本地個案，為一個月內第二宗。居於天水圍的38歲男子，上月11日於荃灣如心化石公園被蚊叮，約一周後出現發燒和頭痛，本周三（28日）入住屯門醫院接受治療，臨牀診斷為腦炎，現時情況穩定。 2017-06-30

日本腦炎由帶日本腦炎病毒的蚊子傳播。主要病媒蚊是三帶喙庫蚊。流行地點包括亞洲及西太平洋地區的郊外及農村。

傳播途徑

蚊子於稻田等大量積水的地方繁殖，叮咬帶病毒的豬隻或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播。此病暫時不會直接由人傳人。



病徵

日本腦炎的潛服期約4-14天。病情輕微者除發燒及頭痛外，一般不會有其他顯著病徵。但病情嚴重者則會出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、震顫、抽搐（尤其是兒童）及癱瘓等症狀，而且病徵較快出現。

治療與後遺症

日本腦炎沒有特定的治療方法。醫生一般會採用**支援性治療**。有病徵的患者死亡率可高達三成。康復者中也有兩至三成有機會出現永久性智力、行為或神經問題，如癱瘓、反復抽搐或失語，後果嚴重。

如何預防日本腦炎

戶外



室內

如房間沒有空調設備，應裝置蚊帳或防蚊網



* 旅遊人士若感到身體不適，如發燒，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生

參考資料：

- https://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20170701/s00002/1498845359988
- <http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/28.html>

以上資料只供參考

更新日期：2017年7月11日

